

**EVALUACIÓN DEL NIVEL DE SATISFACCIÓN Y SU
INFLUENCIA EN LA CALIDAD DE VIDA EN RELACION AL USO
DE PROTESIS TOTAL REMOVIBLE
EN PACIENTES QUE ASISITERON A LA CATEDRA DE CLINICA
DE PROTESIS COMPLETA, 2012-2014 FO, UNCUYO**

Autores: Lottero G, Boero López E, Príncipe S, Jofre G, Lottero R, Villegas V, Ramirez G.

RESUMEN:

El objetivo de la Investigación fue evaluar la mejora en la calidad de vida de pacientes desdentados totales que recibieron rehabilitación protética en la Cátedra de Clínica de Prótesis Completa de la Universidad Nacional de Cuyo, medir el grado de satisfacción logrado a través de la instalación de sus prótesis y relacionarlo con las distintas variables que pueden haber influido en la mejora o no de su calidad de vida. Las variables estudiadas son la edad y sexo. El instrumento utilizado para evaluar y medir la calidad de vida en relación a la salud bucal fue OHIP (Oral Health Impact Profile)

ANTECEDENTES Y JUSTIFICACION:

La salud oral tiene una relación directa con la salud general, con el bienestar y con funciones esenciales en el adulto mayor.¹

A su vez, también tiene relación estrecha con los aspectos psicosociales.¹⁻³ La estética, la apariencia y la postura mejoran con una buena dentadura lo que influye positivamente en su auto-imagen y en su autoestima.^{2,4}

Entre otras cosas, facilita las expresiones de la sexualidad, el habla, la comunicación, la participación familiar y la socialización; por eso la salud oral contribuye significativamente en su calidad de vida.^{1,5} por el contrario, los problemas dentales o el estado edéntulo puede afectar su autoimagen, autoestima, su comunicación y llevarlo al aislamiento y la depresión.⁵

Pero, ¿cuáles son los factores que determinan la satisfacción frente al uso de las prótesis dentales? Según algunos estudios, los efectos que provoca la pérdida dental deben ser considerados por parte del odontólogo dentro del proceso de rehabilitación oral, pues es diferente el proceso que se da en una persona absolutamente resignada por una pérdida dental temprana, que en aquella que se encuentra en una etapa de deterioro físico al que se le suma la pérdida dental.^{4,5}

Teniendo en cuenta lo anterior, el objetivo de la presente investigación fue identificar el nivel de satisfacción logrado a través de la rehabilitación protética realizada.

OBJETIVOS

1. *Evaluar el nivel de satisfacción del paciente frente al nuevo tratamiento*
2. *Evaluar si hubo factores que influyeron negativamente en el uso de las prótesis.*
3. *Determinar si la edad y el sexo fueron un factor importante a la hora de la adaptación al uso de prótesis totales.*

MATERIALES Y METODOS


En el presente estudio transversal retrospectivo, la población de estudio corresponde a los pacientes que asistieron a la Cátedra de Clínica de Prótesis Completa entre los años 2012 y 2014, que requerían para su tratamiento, rehabilitación oral con prótesis total removible, en un rango etario entre 30 y 90 años. Los objetivos se plantearon con una población de 140 pacientes pero las principales dificultades encontradas a la hora de convocar a los ya tratados fueron: cambio de dirección, de teléfono, internación, fallecimiento. Por lo tanto los pacientes evaluados fueron en total cincuenta

Para citar a los pacientes atendidos entre esos años se utilizaron las Historias Clínicas generales y Específicas de la Cátedra de Clínica de Prótesis Completa de la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional de Cuyo, las cuales están resguardadas en el archivo de Historias Clínicas dentro de la Unidad Académica.

La recolección de datos fue realizada en forma personal en la Facultad de Odontología UNCUYO, previa autorización mediante un consentimiento informado firmado por el paciente. (Anexo 1)

Como primer dato estadístico dentro de la muestra registrada estableceremos los parámetros encontrados en cuanto a Sexo y Edad de los pacientes, relacionados con rangos etarios:

- Entre 30 y 40 años (F = 2 , M = 0)
- Entre 40 y 50 años (F = 7 , M = 1)
- Entre 50 y 60 años (F = 8 , M = 5)
- Entre 60 y 70 años (F = 13 , M = 8)
- Entre 70 y 80 años (F = 5 , M = 0)
- Entre 80 y 90 años (F = 0 , M = 1)
- Total de la Muestra = 50 Pacientes (F = 35 y M = 15)



Recolección de Datos mediante la encuesta simplificada para el presente estudio

OHIP (Oral Health Impact Profile)

(Anexo 2)

CLÍNICA DE PRÓTESIS COMPLETA

ENCUESTA: Marcar con una X, lo que corresponda

DIMENSIÓN	N°	PREGUNTAS		
	1	¿Tiene usted incomodidad para pronunciar algunas palabras	Siempre	<input type="radio"/>

LIMITACIÓN FUNCIONAL		debido a problemas con sus dientes, boca o prótesis dentales?	A Veces	<input type="radio"/>
			Nunca	<input type="radio"/>
	2	¿Ha sentido usted que su sensación del gusto ha empeorado debido a problemas con sus dientes, boca o prótesis dentales?	Siempre	<input type="radio"/>
			A Veces	<input type="radio"/>
			Nunca	<input type="radio"/>
DOLOR FÍSICO	3	¿Tiene usted alguna incomodidad dolorosa en su boca?	Siempre	<input type="radio"/>
			A Veces	<input type="radio"/>
			Nunca	<input type="radio"/>
	4	¿Ha sentido usted incomodidad al comer algunos alimentos debido a problemas con sus dientes, boca o prótesis dentales?	Siempre	<input type="radio"/>
			A Veces	<input type="radio"/>
			Nunca	<input type="radio"/>
MOLESTIAS PSICOLÓGICAS	5	¿Ha estado preocupado debido a problemas con sus dientes, boca o prótesis dentales?	Siempre	<input type="radio"/>
			A Veces	<input type="radio"/>
			Nunca	<input type="radio"/>
	6	¿Se ha sentido nervioso debido a problemas con sus dientes, boca o prótesis dentales?	Siempre	<input type="radio"/>
			A Veces	<input type="radio"/>
			Nunca	<input type="radio"/>
INCAPACIDAD FÍSICA	7	¿Ha sido su dieta poco satisfactoria debido a problemas con sus dientes, boca o prótesis dentales?	Siempre	<input type="radio"/>
			A Veces	<input type="radio"/>
			Nunca	<input type="radio"/>
	8	¿Ha tenido usted que interrumpir sus comidas debido a problemas con sus dientes, boca o prótesis dentales?	Siempre	<input type="radio"/>
			A Veces	<input type="radio"/>
			Nunca	<input type="radio"/>

CLÍNICA DE PRÓTESIS COMPLETA





ENCUESTA: Marcar con una X donde corresponda

DIMENSIÓN	N°	PREGUNTAS		
INCAPACIDAD PSICOLÓGICA	9	¿Encuentra usted dificultad para relajarse debido a problemas con sus dientes, boca o prótesis dentales?	Siempre	<input type="radio"/>
			A Veces	<input type="radio"/>
			Nunca	<input type="radio"/>
10	¿Se ha sentido usted perturbado frente a otras personas debido a problemas con sus dientes, boca o prótesis dentales?	Siempre	<input type="radio"/>	
		A Veces	<input type="radio"/>	
		Nunca	<input type="radio"/>	

INCAPACIDAD SOCIAL	11	¿Se ha sentido usted irritable con otras personas debido a problemas con sus dientes, boca o prótesis dentales?	Siempre	<input type="radio"/>
			A Veces	<input type="radio"/>
			Nunca	<input type="radio"/>
	12	¿Tiene usted dificultad de hacer sus trabajos habituales debido a problemas con sus dientes, boca o prótesis dentales?	Siempre	<input type="radio"/>
			A Veces	<input type="radio"/>
			Nunca	<input type="radio"/>
OBSTÁCULOS	13	¿Ha sentido usted que su vida es, en general, menos satisfactoria, debido a problemas con sus dientes, boca o prótesis dentales?	Siempre	<input type="radio"/>
			A Veces	<input type="radio"/>
			Nunca	<input type="radio"/>
	14	¿ Ha sido usted totalmente incapaz de funcionar debido a problemas con sus dientes, boca o prótesis dentales?	Siempre	<input type="radio"/>
			A Veces	<input type="radio"/>
			Nunca	<input type="radio"/>

Limitación FUNCIONAL


Dolor FISICO




. MOLESTIA PSICOLOGICA




. INCAPACIDAD FISICA




. INCAPACIDAD PSICOLOGICA



. INCAPACIDAD SOCIAL



. OBSTÁCULOS



CONCLUSIÓN:

En este estudio se pudo comprobar que los pacientes que tienen problemas con el uso de prótesis manifiestan que los aspectos que más los incomodan son: en primer lugar la alteración del sentido del gusto (limitación funcional), la incomodidad al comer alimentos (dolor), la preocupación por los inconvenientes que puede tener en su relación con otras personas (aflicción psicológica) y tener que interrumpir comidas (discapacidad física).

El resto de los pacientes que no presentan problemas con su uso manifiestan no haber sufrido incapacidad de funcionar y que no ha interferido con la capacidad de relacionarse con otras personas y en el desarrollo de las actividades diarias (discapacidad social).

Por lo que podemos concluir que aquellos pacientes que asistieron a la Cátedra de Clínica de Prótesis Total de la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional de Cuyo entre los años 2012 y 2014, fueron en su mayoría mujeres, que predominaron los pacientes de entre los 60 y 70 años, y que en general al momento de la Encuesta se encontraban conformes con la rehabilitación recibida.

BIBLIOGRAFÍA

1. Reyes C. Principios de odontogediatria. Revista de Estomatología de la Universidad del Valle 1992; 2: 100 – 103.
2. Barragán J, y col. Diseño y edición de un audiovisual, como medio para la modificación de la actitud frente al tratamiento protésico en pacientes de la tercera edad. Revista Científica de la Universidad El Bosque 1997; 3: 97 – 102.
3. González J, Ochoa MS. La desdentación y la vejez a través de la mitología, la pintura y la literatura (parte I-II). Prof Dent 2002; 5.
4. Matiz J. Implicaciones psicológicas relacionadas con la pérdida dental y con el uso de prótesis dental en la tercera edad. Oral - Día 1993: 13.
5. Matiz J, Bermúdez R. Posibles modificaciones en el comportamiento sexual en pacientes de tercera edad que utilizan prótesis dental removible. Revista de la Asociación Colombiana de Gerontología y Geriatria 1998; 12: 91 – 96.
6. Hoyos M, Marulanda F. Psicología del envejecimiento. Revista de la Asociación Colombiana de Gerontología y Geriatria 1998; 12: 15 - 24.
7. Marín D y col. Influencia de la rehabilitación con prótesis totales en el cambio de dieta del adulto mayor. Revista de la Asociación Colombiana de Gerontología y Geriatria 2003; 17: 553 - 559.